

こどもの定期予防接種

- ・全て個別接種です。かかりつけ医師とよく相談し、予約して受けましょう。料金は無料です。
- ・接種を受ける前に冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読みましょう。

種 類	接種可能な年齢・()内は標準的な接種年齢	受け方・その他
BCG	生後0～12か月未満(生後5～8か月未満)	1回
ロタウイルス感染症	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 出生6週0日後から24週0日後まで	27日以上の間隔で2回
	五価経口弱毒生ロタウイルスワクチン 出生6週0日後から32週0日後まで	27日以上の間隔で3回
百日せき・ジフテリア 破傷風・ポリオ Hib(ヒブ) (5種混合)	〈1期初回〉生後2か月～90か月未満 (生後2か月～7か月までに開始)	20日～56日の間隔で3回
	〈1期追加〉生後90か月未満 (初回(3回接種)終了後、12か月～18か月の間隔をあける)	初回終了後、1回
百日せき・ジフテリア 破傷風・ポリオ (4種混合)	〈1期初回〉生後2～90か月未満(生後2～12か月)	20日以上の間隔で3回
	〈1期追加〉1期初回終了から12～18か月後 (1期初回終了から少なくとも6か月はあける) ※ただし生後90か月未満	初回終了後、1回
ジフテリア・破傷風 (2種混合)	〈2期〉11～13歳未満(11歳)	1回
Hib(ヒブ) (インフルエンザ菌b型)	生後2か月～5歳未満 〈初回〉:生後2～7か月未満 〈追加〉:初回終了後7か月～13か月あける	初回:3回 追加:1回
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満 〈初回〉:生後2～7か月未満 〈追加〉:生後12か月～15か月の間に初回終了後60日以上あける	初回:3回 追加:1回
B型肝炎	生後0～12か月未満(生後2～9か月未満)	27日以上の間隔で2回接種後、1回目 の接種から139日以上の間隔で1回
麻しん(はしか) ・風しん混合	〈1期〉生後12～24か月未満	1回
	〈2期〉5～7歳未満で小学校入学前の1年間	1回
水痘(みずぼうそう)	生後12～36か月未満(生後12～15か月未満) 2回目は初回終了後6か月～12か月あける	2回
日本脳炎	〈1期初回〉生後6～90か月未満(3歳)	6日以上の間隔で2回
	〈1期追加〉生後90か月未満(4歳1期初回終了の約1年後)	初回終了後、6か月以上の間隔で1回
	〈2期〉9～13歳未満(9歳)	1回
子宮頸がん	〈定期接種〉 小学6年生～高校1年生相当の女子(中学1年生の女子) ※令和7年度対象者:平成21年4月2日～平成26年4月1日生まれの人	3回
	〈キャッチアップ接種〉 平成9年4月2日～平成21年4月1日生まれの人で令和7年3月31日 までに1回以上接種した人	不足分(2～3回)

持 参 す る 物 ・母子健康手帳・マイナ保険証等・こども医療費受給資格者証(お持ちの人)

問い合わせ先:健康福祉課 ☎086-482-2483

岡山県小児救急電話相談(#8000または086-801-0018)をご利用ください。

こどもの夜間の急な発熱、けいれんなど急な病気で不安な時に、症状への対応方法などについて看護師等が電話でご相談に応じるとともに、医療機関への受診について適切なアドバイスがもらえます。

相談時間

平日:19時～翌朝8時 土曜:18時～翌朝8時 日・祝(年末年始)8時～翌朝8時